



Tomate de cascara



NOTAS:

FOLIAR	Se pueden hacer las aplicaciones foliares de GUANOFOL® juntamente con insecticidas de control, fertilizantes foliares y hormonas. Es recomendable aplicar los fungicidas y bactericidas por separado.
AL SUELO	Se puede mezclar con fertilizantes químicos, a excepción de ácidos o productos altamente alcalinos. Se recomienda complementar con BIOFERT®, fertilizantes químicos, compostas, Lombricompostas, etc.

IMPORTANTE: Todas estas aplicaciones deberán hacerse con la planta bien hidratada.

Recomendaciones para aplicar los productos de BIO-BARO:

Producto	Problema	Periodo de Aplicación	Dosis: (L/ha)
BEMEDEEN	HONGOS Y BACTERIAS	Al transplante	2
	TIZON, CENICILLA, BACTERIAS	A los primeros síntomas 10-15 días	1-2
BIOATRAX	LARVAS DEL SUELO	Primer riego	2
	GUSANO DEL FRUTO SOLDADO, TROZADOR, TRIPS, MOSCA BLANCA	Primeros síntomas	1-2
BIO CALE	TRIPS, MOSCA BLANCA	Primeros síntomas	1-2
BIO TRICO	HONGOS	Al transplante	2